

# Information från Novo Nordisk till er som behandlar patienter med typ 2-diabetes

## 1 GÅNG I VECKAN **OZEMPIC**<sup>®</sup> semaglutid injektion

**Nu innehåller OZEMPIC<sup>®</sup> (semaglutid) 1 mg injektionspenna 8 doser i varje injektionspenna.**

Nu har Novo Nordisk uppdaterat OZEMPIC<sup>®</sup> med åtta veckors behandling per penna, istället för tidigare fyra doser. Det innebär att patienten använder samma förfyllda injektionspenna en gång i veckan<sup>†</sup> – men att plastförbrukningen minskas med hälften så många pennor per patient.<sup>1†</sup>

**8**  
8 veckor  
8 doser  
1 förpackning<sup>1</sup>

### Till vuxna med typ 2-diabetes Ozempic<sup>®</sup> injektionsvätska lösning i förfylld injektionspenna

Styrka	Antal	Varunummer
0,25 mg	1x4 doser	510642
0,5 mg	1x4 doser	123895
1,0 mg	1x8 doser	397603



Vid frågor – kontakta:

Novo Nordisk Scandinavia AB

✉ kundtjanst-se@novonordisk.com

☎ 020-98 18 10 vardagar 8:30 -16:00



Läs mer om OZEMPIC<sup>®</sup>  
på [novokunskap.se](http://novokunskap.se)



#### SENASTE NYTT FRÅN NOVO NORDISK

Vi vill gärna erbjuda dig den senaste informationen inom diabetes- och obesitasområdet. Scanna QR-koden för att anmäla dig till våra uppdateringar. Du kommer t.ex. få ta del av mötesinbjudningar, patientstöd, checklistor och nyheter om våra läkemedel direkt i din inbox.

† Alla förpackningsstorlekar kanske inte marknadsförs. Resultaten gäller inte specifikt för Ozempic®-pennan. Ozempic®-pennan bygger på FlexTouch®-tekniken som används för andra produkter från Novo Nordisk.

‡ Vid byte från en FlexTouch® OZEMPIC® 4-veckors 1 mg penna till en 8-veckors 1 mg penna, minskas antalet pennor per patient för samma behandlingstid (8 veckor).

**Referens: 1.** Ozempic produktresumé, se fass.se.

**Ozempic®** (semaglutid) Rx, (F), ATC-kod: A10BJ06. 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. 2 mg tillhandahålls ej. Diabetesmedel. Glukagonlikpeptid-1-receptor (GLP-1) analoger. **Indikation:** Behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion, som monoterapi när metformin anses olämpligt på grund av intolerans eller kontraindikationer och som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes. **Varningar och försiktighet:** Semaglutid ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidosis. Semaglutid är ingen ersättning för insulin. Akut pankreatit är en mindre vanlig biverkning av Ozempic®. Patienter bör informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Vid misstänkt pankreatit ska behandlingen med semaglutid upphöra. Om pankreatit fastställs, ska semaglutid inte sättas in igen. Det finns ingen erfarenhet från patienter med kronisk hjärtinsufficiens NYHA-klass IV och semaglutid rekommenderas därför inte till dessa patienter. Hos patienter med diabetesretinopati som behandlas med insulin och semaglutid har en ökad risk för att utveckla komplikationer av diabetesretinopati observerats. Försiktighet ska vidtas när semaglutid används till patienter med diabetesretinopati som behandlas med insulin. Semaglutid 2 mg rekommenderas inte till patienter med typ 2-diabetes med okontrollerad eller potentiellt instabil diabetesretinopati. **Graviditet och amning:** Semaglutid ska inte användas under graviditet och under amning. Fertila kvinnor rekommenderas att använda en preventivmetod när de behandlas med semaglutid. Semaglutid ska sättas ut minst 2 månader före en planerad graviditet på grund av den långa halveringstiden. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 06/2025. **Subventioneras endast för patienter med typ 2-diabetes som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.** Juli 2025 SE25OZM00041

SE25OZM00062 10/2025



**Novo Nordisk Scandinavia AB**  
Tel 040-38 89 00 [www.novonordisk.se](http://www.novonordisk.se)

1 GÅNG I VECKAN  
**OZEMPIC®**  
semaglutid injektion